

FICHA TÉCNICA CINSTRESSB

Aminoácido Inorgánico

CINSTRESSB es un producto a base de un complejo vitamínico y dos aminoácidos esenciales que elonga y fortifica las plantas contra el estrés biótico y abiótico mejorando el amarre de frutos, aumentando la actividad fotosintética de las plantas logrando una recuperación en menor tiempo, las floraciones tienen mayor éxito en fructificación. El producto actúa como las enzimas en las plantas, participa en la resistencia de la planta además de la síntesis de la clorofila.

Precauciones o advertencias de uso. -

CINSTRESSB es un producto que no es tóxico para los humanos ni animales, tenga precaución de no aplicar en los ojos, o en la piel no fume mientras lo aplica y no beba. Utilice equipo de protección adecuado como son guantes, overoles, botas de neopreno, cubrebocas, googles, ya que el producto se puede mezclar con otros productos y es posible que estos requieran medidas de protección.

Instrucciones de uso:

CINSTRESSB se puede aplicar foliar o al suelo por sistema o directo a la raíz con mochila diluido en agua para árboles frutales y moje el cepellón para trasplante.

Cuando aplique foliar, al suelo con mochila o por sistema de riego hágalo cada 8 a 10 días máximo. (Las mochilas no deberán traer boquilla para aplicar al suelo, aplicar a 1 metro de la base del tronco en árboles frutales menores de 5 años)

En las aplicaciones foliares con equipo mecánico de aspersión y tractor se recomienda calibrar la dosis de agua de acuerdo con la recomendada por hectárea, se puede aplicar al suelo a través de riego por goteo o mochila

Método de preparación y aplicación:

No es necesario batir el producto antes de abrir no se precipita, se recomienda hacer una premezcla antes de preparar la mezcla definitiva, el producto en general no reacciona o se precipita ni crea grumos al mezclar con otros productos, el intervalo de aplicación depende del cultivo y de la severidad del stress de la planta, en plantaciones como solanáceas, cucurbitáceas y verduras puede aplicar cada 8 o 10 días, en árboles frutales cada 30 días y en papayas cada 21 días. En caso de intoxicación en los cultivos el resultado se aprecia en pocos días.

Fitotoxicidad:

En los cultivos aquí recomendados y las dosis recomendadas no es fitotóxico, de preferencia las aplicaciones deberán ser temprano por la mañana o antes de que se ponga el sol por la tarde

Dosis de aplicación por cultivo.

PUERTO ALEGRE No 37, COLONIA MIRAMAR ZAPOPAN, JALISCO. MEXICO TEL: 33 36296268

Tipo de cultivo	Dosis	Tipo aplicación	Periodicidad de aplicación
Alfalfa, chícharo, ejote, Habas, garbanzo, Frijol.	5 ml / litro	Foliar	3 aplicaciones por ciclo y al inicio de floración
			Cada 8 días
sandias, melón, pepino, calabaza	5 ml / litro	Foliar	Al inicio de floración repetir a los 10 días y después del 1er corte del fruto
	1 a 1.5 litros / hectárea	Por sistema o drech	Al trasplante
Jitomate, tomatillo, berenjena, chiles, papas, zanahorias.	5 ml / litro	Foliar	Al inicio de la floración y repetir cada 15 días
	1 litro / hectárea	Por sistema	Al trasplante
Papayas	1 litro/hectárea	Foliar	Aplicar cada 15 días a partir del primer mes de trasplantada
	1 a 1.5 litros / hectárea	Por sistema	Al trasplante
Frutales (aguacates, mangos, guayabas, limones etc.)	1 litro / hectárea	foliar	Aplicar al inicio de floración y repetir a los 15 días
Maíz, Arroz	1 litro/ hectárea	foliar	Aplicar en caso de intoxicación o poco desarrollo
Piñas, Maguey	1 litro/hectárea	foliar	Aplicar en caso de intoxicación o helada
Zarzamora, Frambuesa, Arándanos	1 litro/hectárea	Por sistema/Foliar	Aplicar para trasplante, estrés y cuajado de flor
En caso de intoxicación del cultivo por herbicidas, insecticidas aplique vía foliar			

Primeros auxilios. -

En caso de que le caiga en los ojos o la piel, lave con abundante agua. No requiere de manejo específico utilice medidas sintomáticas. No debe beber el producto antes ni diluido ya que se puede mezclar con otros productos agrícolas.

En caso de intoxicación lleve al paciente al médico con la etiqueta y las otras etiquetas con las que preparo la mezcla.



Condiciones de almacenamiento y manejo. -

Almacene en lugares secos y frescos, no lo transporte con productos alimenticios o ropas, no lo prepare o diluya cerca de ríos o arroyos.

Composición, cada litro contienen:

Ácido ascórbico	60.975 g/litro
Tiamina	0.066 g/litro
Piridoxina	0.024 g/litro
Cianocobalamina	0.001 g/litro
Leucina	0.242 g/litro
Glicina	0.122 g/litro
Diluyentes y acondicionadores	938.570 g/litro
Total	1000.000 g/litro

EXPORTADORA ALNEN SA de CV. Garantiza que el contenido de este envase se encuentra conforme a las especificaciones de la etiqueta, pero su dosificación, almacenaje, manejo y aplicación están fuera de nuestro control por lo tanto no se hace responsable de los resultados que se obtengan con el mismo.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Fabricado por:

Exportadora Alnen S.A. de C.V.

ventas@alnen.com